Caulerpa racemosa var. *macrophysa* (Sonder ex Kützing) W.R. Taylor

phylum Chlorophyta › clase Bryopsidophyceae › orden Bryopsidales › familia Caulerpaceae



Hábito



Detalle de las ramas determinadas

Descripción

Algas formadas por una porción estolonífera y una erecta de 3-5 cm de alto, color verde grama, fijadas al sustrato mediante rizoides. Porción erecta ramificándose irregularmente, con ramas determinadas creciendo en varios planos, esféricas, 3-7 mm de diámetro, esparcidas o agrupadas, con un corto estipe. Estructura interna constituida por filamentos cenocíticos, con trabéculas.

Información Geográfica y Ecológica

Colectada para el proyecto en


• Cayo Sal
- Coordenadas Geográficas: 11º 46' 30.7'' N, 66º 44' 47.9'' O • Coordenadas UTM: 745559 E, 1302683 N
Litoral rocoso sumergido, 1,5 m de profundidad, oleaje moderado.
• Dos Mosquises Norte
- Coordenadas Geográficas: 11º 48' 17.0'' N, 66º 53' 19.6'' O • Coordenadas UTM: 730038 E, 1305826 N
Arrecife de coral, hasta 10 m de profundidad, oleaje moderado.
• Gran Roque
- Coordenadas Geográficas: 11º 57' 03.0'' N, 66º 40' 11.9'' O • Coordenadas UTM: 753755 E, 1322185 N
Litoral rocoso emergente, zona intermareal, oleaje fuerte.

Referencias

Littler, D. S. & M. M. Littler. 2000. Caribbean reef plants. An identification guide to the reef plants of the Caribbean, Bahamas, Florida and Gulf of Mexico. *OffShore Graphics, Inc. Washington,* 542 pp.

Taylor, W. R. 1960. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of the Americas. *The University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan,* 870 pp.

Distribución geográfica



Proyecto Ficoflora Venezuela (c) G3C