Caulerpa cylindracea Sonder

phylum Chlorophyta › clase Bryopsidophyceae › orden Bryopsidales › familia Caulerpaceae



Hábito



Detalle de las ramas determinadas

Descripción

Algas formadas por una porción erecta y una estolonífera, de 10-15 cm de alto, color verde grama, fijadas al sustrato mediante rizoides. Ramas determinadas clavadas, 3-7 mm de largo, dispuestas en 2 o 4 hileras verticales y opuestas. Estructura interna constituida por filamentos cenocíticos, con trabéculas.

Información Geográfica y Ecológica

Colectada para el proyecto en

• Boca de Cote

- Coordenadas Geográficas: 11º 45' 52.9'' N, 66º 41' 58.3'' O • Coordenadas UTM: 750704 E, 1301561 N


Fondo arenoso con praderas de *Thalassia testudium*, hasta 1 m de profundidad, oleaje moderado.

Referencias

Belton, G. S., W. F. Van Reine, J. M. Huisman, S. G. A. Draisma & C. F. D. Gurgel. 2014. Resolving phenotypic plasticity and species designation in the morphology challenging *Caulerpa racemosa-peltata* complex (Caulerpaceae, Chlorophyta). *Journal of Phycology* 50(1):32-54.

Littler, D. S. & M. M. Littler. 2000. Caribbean reef plants. An identification guide to the reef plants of the Caribbean, Bahamas, Florida and Gulf of Mexico. *OffShore Graphics, Inc. Washington,* 542 pp.

Distribución geográfica



Proyecto Ficoflora Venezuela (c) G3C